

## Terminarz oprysków drzew owocowych 2022

| Roślina                          | Choroba lub szkodnik                                                                      | Profilaktyka                                                                                                                                                           | Metoda niechemiczna                                                                                                                                                                  | Metoda chemiczna                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Okres bezlistny</b>           |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
| drzewa owocowe                   | parch jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, parch gruszy, drobna plamistość liści | Prześwietlenie koron                                                                                                                                                   | wyciąg z krwawnika pospolitego (1:10)                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| drzewa owocowe                   | brunatna zgnilizna drzew pestkowych                                                       | zbieranie i niszczenie zaschniętych owoców                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
| drzewa owocowe                   | szkodniki wielożerne                                                                      |                                                                                                                                                                        | zbieranie i wyносzenie poza obręb ogrodu złóż jaj pierścienicy nadrzewki, znamiówki tarniówki oraz gniazd zimowych kuprowki rudnicy                                                  |                                                                                                                                            |
| drzewa owocowe                   | samice piędzika przedzimka oraz innych miernikowców                                       |                                                                                                                                                                        | w drugiej połowie października zakładanie na pniach drzew opasek lepowych do wyłapywania wędrujących po pniu samic piędzika                                                          |                                                                                                                                            |
| drzewa owocowe                   | jaja przędziorków, larwy misecznika i inne                                                |                                                                                                                                                                        | opryskiwać powierzchnie kory bardzo dokładnie preparatem Promanal 60 EC, Emulpar 940 EC, gnojówką fermentującą z pokrzywy zwyczajnej                                                 |                                                                                                                                            |
| drzewa owocowe                   | mszyce                                                                                    | zapobiegawczo wyciąg bez rozcieńczenia ze skrzypu polnego oraz pokrzywy, krwawnika pospolitego, czosnku pospolitego (1:1), rumianku pospolitego (1:5), cebuli jadalnej | gnojówka z pokrzywy (1:20) lub fermentującej (1:50), Promanal 60 EC, Emulpar 940 EC                                                                                                  |                                                                                                                                            |
| brzoskwinia                      | kędzierzawość liści brzoskwini                                                            |                                                                                                                                                                        | Jesienią zastosować gnojówkę z pokrzywy (1:10) lub wyciąg z krwawnika pospolitego (1:10)                                                                                             | Zabieg Miedzianem 50 WP należy wykonać jesienią po opadnięciu liści, a Syllitem 65 WP w okresie poprzedzającym pękanie pąków prz temp. 6°C |
| <b>Okres nabrzmiewania pąków</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |
| brzoskwinia i morela             | rak bakteryjny                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Miedzian 50 WP                                                                                                                             |
| śliwa                            | torbiel śliw                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Syllit 65 WP                                                                                                                               |
| wiśnia i czereśnia               | brunatna zgnilizna drzew pestkowych                                                       | unikać sadzenia szczególnie wrażliwych odmian                                                                                                                          | wycinać zaschnięte cienkie pędy poniżej nekrotycznych zmian zabieg przeprowadzić szczególnie dokładnie na tych drzewach, na których choroba licznie występowała w poprzednich latach | Switch 62,5 WG                                                                                                                             |

|                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| drzewa owocowe                  | przędziorki                                     | zapobiegawczo zastosować wyciąg z czosnku pospolitego (1:1) oraz wyciąg bez rozcieńczenia z cebuli zwyczajnej, mniszka pospolitego i napar bez rozcieńczenia z cebuli zwyczajnej | gnojówka z pokrzywy (1:20) , Emulpar 940 EC                                                                                                                                                                                                                        | Nissorun Strong 250 SC lub Ortus 05 SC, środek stosować po zaobserwowaniu szkodnika, tylko 1 raz w sezonie |
| brzoskwinia                     | kędzierzawość liści brzoskwini                  |                                                                                                                                                                                  | opryskiwać wywarem bez rozcieńczania i wyciągiem z krwawnika pospolitego (1:10); tuż przed pękaniem pąków rozpocząć opryski preparatem Lecitec co 5 dni, wykonując maksymalnie 12 oprysków w sezonie, opryski Lecitec można kontynuować do fazy dojrzewania owoców | Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC lub Syllit 65 WP                                                     |
| jabłoń                          | mączniak prawdziwy                              |                                                                                                                                                                                  | tuż przed pękaniem pąków rozpocząć opryski preparatem Lecitec co 5 dni, wykonując maksymalnie 12 oprysków w sezonie, opryski Lecitec można kontynuować do fazy dojrzewania owoców                                                                                  |                                                                                                            |
| Okres pękania pąków             |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| Jabłoń                          | kwiecień jabłonowiec                            | kwiecień jest szkodliwy tylko w latach słabego kwitnienia                                                                                                                        | w ciepłe dni wstrząsać kwieciami z drzewa na płachtę, po kwitnieniu należy zbierać i niszczyć opanowane pąki zastosować wywar z wrotczyca pospolitego (1:5)                                                                                                        | Deltam Ogród 015 EW                                                                                        |
| Jabłoń, grusza                  | zaraza ogniowa                                  | profilaktyczny oprysk z liści orzecha włoskiego lub sumaka octowca                                                                                                               | zaatakowane drzewa wycinać i niszczyć, a w początkowym okresie występowania choroby wycinać porażone fragmenty koron                                                                                                                                               | Miedzian 50 WP                                                                                             |
| mszyce                          |                                                 |                                                                                                                                                                                  | mniszek pospolity (wyciąg bez rozcieńczenia)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
| brzoskwinia, morela, śliwa      | mączniak prawdziwy                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siarkol Extra 80 WP, Siarkol 800 SC (opryski można wykonać aż do początku kwitnienia)                      |
| Ukazywanie się pierwszych liści |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| jabłoń, grusza                  | parch jabłoni, parch gruszy                     | uprawiać odmiany tolerancyjne, prześwietlać rośliny, usuwać opadłe liście                                                                                                        | Opryskiwanie wyciągiem ze skrzypu lub preparatem Evasiol                                                                                                                                                                                                           | Miedzian 50 WP, Mythos 300 SC                                                                              |
| Jabłoń                          | mączniak jabłoni                                | unikać uprawy wrażliwych odmian                                                                                                                                                  | wycinać porażone pędy, opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10) , oprysk preparatem EVASIOŁ powtarzany co 7-14 dni, opryski LIMOCIDE co 7 dni                                                                                                                       | Magnicur Gold, Zato 50 WG, Siarkol Extra 80 WP                                                             |
| Zielony pąk kwiatowy            |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| Jabłoń, grusza                  | gąsienice zjadające liście                      |                                                                                                                                                                                  | ręczne zbieranie gąsienic                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
| Różowy pąk kwiatowy             |                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| jabłoń                          | gąsienice przędzika, namiotków, zwójki liściowe | zbieranie skupisk żerujących gąsienic namiotków w początkowym okresie ich żerowania                                                                                              | Lepinox Plus                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |

Przez cały okres wegetacji wykonywać opryski zapobiegawcze preparatami

|                           |                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jabłoń                    | Owocnica jabłkowa                      | wykrywanie obecności owocnicy za pomocą białych tablic lepowych | wyciąg z wrotycza pospolitego (1:2)                                                                                                                                                                                          | Karate Gold, Mospilan 20 SP                                                                                  |
| grusza                    | rdza gruszy                            |                                                                 | wywar ze skrzypu polnego (1:4), wywar bez rozcieńczenia z cebuli jadalnej, czosnku pospolitego                                                                                                                               | Zato 50 WG, Miedzian 50 WP                                                                                   |
| <b>Biały pąk kwiatowy</b> |                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| śliwa, czereśnia, wiśnia  | brunatna zgnilizna drzew pestkowych    | nie sadzić wrażliwych odmian                                    | opryskiwać wyciągiem z krwawnika (1:10) lub skrzypu polnego (1:4)                                                                                                                                                            | Signum 33 WG, Switch 62,5WG, Miedzian 50 WP                                                                  |
|                           | mszyce                                 |                                                                 | wycinanie zakończeń pędów z koloniami mszyc opryskiwanie wyciągiem z pokrzywy lub wrotycza                                                                                                                                   | Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS                                                                           |
| <b>Kwitnienie</b>         |                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Jabłoń, grusza            | parch jabłoni, parch gruszy            |                                                                 | opryskiwanie wywarem (1:4) ze skrzypu polnego lub preparatem EVASIOŁ opartym na skrzypie polnym. Opryski EVASIOŁEM powtarzać co 7 dni. Wykonać 2-6 oprysków do momentu zasychania kwiatów                                    | Miedzian 50 WP                                                                                               |
| jabłoń, grusza            | mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy   |                                                                 | wycinanie pędów z objawami mączniaka, opryski preparatem EVASIOŁ tak jak na parcha, opryski preparatem LIMOCIDE co 7 dni                                                                                                     | Siarkol Extra 80 WP, Siarkol 800 SC (oprysk wykonać tuż przed kwitnieniem lub po zauważeniu objawów choroby) |
| jabłoń, grusza            | miodówka jabłoniowa, miodówka gruszowa |                                                                 | po wykryciu szkodnika wykonać opryski preparatami LIMOCIDE i AGROCOVER, preparaty stosować naprzemiennie w odstępach co 7 dni, można kontynuować aż do okresu dojrzewania owoców, wykonując maksymalnie 6 oprysków w sezonie |                                                                                                              |
| czereśnia, wiśnia         | rak bakteryjny                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | Miedzian 50 WP                                                                                               |
| czereśnia, wiśnia         | brunatna zgnilizna drzew pestkowych    | systematycznie usuwać porażone pędy                             | wyciąg z krwawnika lub odwar ze skrzypu oraz gnojówka, wywar, napar bez rozcieńczenia ze chrzanu pospolitego                                                                                                                 | Signum 33 WG, Switch 62,5WG, Miedzian 50 WP                                                                  |
| brzoskwinia               | kędzierzawość liści brzoskwini         |                                                                 | opryski preparatem EVASIOŁ, wykonać 2-6 oprysków w odstępach co 7 dni, opryski można wykonywać do fazy zasychania pąków                                                                                                      | Miedzian 50 WP                                                                                               |
| <b>Koniec kwitnienia</b>  |                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| drzewa owocowe            | szpeciele                              | dokładne oglądanie liści                                        | usuwanie liści z objawami żerowania                                                                                                                                                                                          | Mospilan 20 SP, Ortus 05 SC                                                                                  |
| grusza                    | kwiecień gruszowiec                    | szczególnie groźny na starszych gruszach                        | na przełomie kwietnia i maja obrywać brązowe pąki zimowe z larwami kwieciaka                                                                                                                                                 | Deltam Ogród 015 EW                                                                                          |
| śliwa                     | owocnica żółtoroga                     | wykorzystywać białe pułapki lepowe                              | usuwanie z drzew i niszczenie zawiązków ze świeżymi wgryzami, przekopywanie w czerwcu ziemi pod drzewami                                                                                                                     | Mospilan 20 SP                                                                                               |

**tem GUARD zawierającym dobroczynne bakterie. Opryski wykonywać co 14-21 dni, można łączyć z nawożeniem dolistnym. Guard**

|                            |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| drzewa owocowe             | mszyce                               |                                                                                                                                            | opryski z pokrzywy, czosnku, cebuli, mydło potasowe o zapachu czosnku, Emulpar 940 EC, Agricolle, Agrocover                                                                       | Karate Zeon 050 CS, Mospilan 20 SP                                                                                       |
| brzoskwinia                | kędzierzawość liści brzoskwini       |                                                                                                                                            | systematycznie usuwać porażone liście, drzewa opryskiwać wyciągiem z krwawnika, skrzypu polnego, pokrzywy, kontynuować opryski preparatami LECITEC (co 5 dni), EVASIOŁ (co 7 dni) |                                                                                                                          |
| Jabłoń                     | Owocnica jabłkowa                    |                                                                                                                                            | wyciąg z wrotczyca pospolitego (1:2)                                                                                                                                              | Mospilan 20 SP (oprysk w okresie opadania płatków kwiatowych) lub Karate Gold (oprysk po zauważeniu obecności szkodnika) |
| Po kwitnieniu              |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| wiśnia                     | drobna plamistość drzew pestkowych   | unikać uprawy wrażliwych odmian                                                                                                            | usuwać opadające liście                                                                                                                                                           | Syllit 65 WP                                                                                                             |
| jabłoń, grusza             | mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | Siarkol Extra 80 WP, Siarkol 800 SC (oprysk wykonać bezpośrednio po kwitnieniu)                                          |
| brzoskwinia, morela, śliwa | mączniak prawdziwy                   |                                                                                                                                            | opryski preparatem LIMOCIDE w odstępach co najmniej 7 dni aż do fazy dojrzałości owoców, maksymalnie 6 zabiegów w sezonie                                                         | Siarkol Extra 80 WP, Siarkol 800 SC                                                                                      |
| Okres rozwoju zawiązków    |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| jabłoń                     | parch jabłoni                        |                                                                                                                                            | wywar ze skrzypu polnego (1:4)                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| Jabłoń                     | mączniak jabłoni                     |                                                                                                                                            | odwar ze skrzypu, opryski preparatem LECITEC co 5 dni, opryski preparatem EVASIOŁ co 7-14 dni                                                                                     | Zato 50 WG, Topas 100 EC                                                                                                 |
| jabłoń, śliwa              | owocówka                             | zwalczanie należy ustalić na podstawie stopnia opanowania w poprzednim roku za pomocą tablic lepowych                                      | zawiesić pułapki feromonowe zawiesić na drzewach, gąsienice wylapywać za pomocą opasek z papieru falistego zakładanych na pniu drzew                                              | Mospilan 20 SP                                                                                                           |
| czereśnia, wiśnia          | nasionnica trześniówka               | przykrywanie siatką powierzchni ziemi, w obrębie korony w okresie spodziewanego wylotu, przekopywanie gleby pod drzewami po zbiorze owoców | żółte pułapki lepowe zawiesić w drugiej połowie maja, przy opanowaniu zebrać owoce przed osiągnięciem dojrzałości, aby zapobiec wejściu larw w glebie                             | Mospilan 20 SP                                                                                                           |
| Okres wzrostu owoców       |                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| jabłoń                     | parch jabłoni                        |                                                                                                                                            | opryskiwać odwarem ze skrzypu polnego (1:4)                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| Jabłoń                     | mączniak jabłoni                     |                                                                                                                                            | obrywanie porażonych liści, opryskiwać wyciągiem z krwawnika                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Jabłoń                     | mszyca jabłoni                       | szczególnie groźna na młodych drzewkach                                                                                                    | wycinać pędy porażone mszycami, Agricolle, Agrocover, Emulpar 940 EC                                                                                                              |                                                                                                                          |
| Jabłoń                     | bawełnica korówka                    | najbardziej liczna na starych drzewach                                                                                                     | ręczne zbieranie mszyc, Agricolle, Agrocover, Emulpar 940 EC                                                                                                                      |                                                                                                                          |

nie łączyć z fungicydami (zachować 7 dni odstępu od oprysku fungicydem).

|                |              |  |                                                                                                                             |  |
|----------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| śliwa          | mszyce       |  | opryskiwać wyciągiem z wrotycza i pokrzywy, Agricolle, Agrocover, Emulpar 940 EC                                            |  |
| grusza         | parch gruszy |  | oprysk odwarem ze skrzypu polnego                                                                                           |  |
| Po zbiorach    |              |  |                                                                                                                             |  |
| Jabłoń, grusza | parch        |  | Oprysk 5% roztworem mocznika w okresie opadania liści z drzew. Opryskujemy dokładnie całą koronę drzewa i liście już opadłe |  |

Tutaj kupisz środki ochrony roślin wymienione w tabeli: **Środki Ochrony Roślin - Sklep Ogrodniczy**